BERN Z+

Polifenoles + Zinc de aplicación foliar

- Estrés + Granos + Rindes

BERN Z+ es un producto natural, innovador, para aplicación foliar, elaborado en base a una combinación de extractos vegetales complementados con Zinc para activar los procesos metabólicos de la planta, estimulando la síntesis proteica asociada con la fijación y el crecimiento de los frutos en diferentes cultivos.

Los extractos vegetales de **BERN Z+** están compuestos por polifenoles que naturalmente activan el proceso metabólico de las plantas. Sin embargo estos procesos pueden no cumplirse en plenitud cuando hay deficiencia de algunos nutrientes.

El Zinc participa de una gran cantidad de procesos metabólicos y también es el micronutriente que presenta deficiencia con mayor frecuencia; ya sea por escasez (como sucede en suelos arenosos o muy livianos), o bien por una baja absorción relacionada con la baja solubilidad de este nutriente en suelos alcalinos o situaciones de alta concentración de fertilizantes o en suelos con bajo contenido de materia orgánica.

ACCIÓN EN LA PLANTA

BERN Z+ optimiza el metabolismo vegetal permitiendo un mejor aprovechamiento de la actividad fotosintética, aumentando la producción de hidratos de carbono, proteínas y lípidos que se traducen en mayor cantidad y calidad del producto final.

BERN Z+ es da aplicación foliar y sus beneficios son:

1. **Aporte de Zn y mejor eficiencia en el uso metabólico del nutriente en la planta.**

BERN Z+

2. **Mejora salud y funcionamiento fisiológico del cultivo ante: Altas temperaturas, déficit hídricos y alta presión de patógenos.**

3. **Mayor rendimiento: N° de granos. Mayor calidad.**

4. **Cero residuos. Sin agregado de hormonas de síntesis.**

5. **Amigable para el aplicador.**

RECOMENDACIONES DE USO BERN Z+

CULTIVO	DOSIS POR APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIÓN	CULTIVO	DOSIS POR APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Soja	0,5-1 l/ha	V6 A R3	Girasol	0,5-1 l/ha	V4 - ESTADIO ESTRELLA
Trigo	0,5-1 l/ha	MACOLLAJE A DIFERENCIACIÓN PRIMORDIO FLORAL	Arroz	0,5-1 l/ha	MACOLLAJE A DIFERENCIACIÓN PRIMORDIO FLORAL
Maíz	0,5-1 l/ha	V4 A V10	Sorgo	0,5-1 l/ha	V4 A V10
Algodón	0,5-1 l/ha	PRIMERA FLOR BLANCA Y 15-20 DÍAS DESPUÉS	Poroto	0,5-1 l/ha	MOMENTO DE DIFERENCIACIÓN FLORAL